

Jahresmittel Schwefeldioxid [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Kontinuierliches Messverfahren, Werte bezogen auf 1013 hPa und 20 °C

	Wester- land	Zingst	Neuglob- sow	Waldhof	Schmücke	Deusel- bach	Brotjackl- riegel	Schau- insland	Forellen- bach	Helgo- land	Aukrug	Uecker- münde	Schorf- heide	Bassum	Gittrup	Falken- berg	Melpitz	Leine- felde	Lücken- dorf	Lehn- mühle	Regnitz- losau	Öhringen	Raisting			
1984	8.2			22.3		16.0		4.1						12.1	15.1						29.2					
1985	8.1			25.0		16.1		5.2						12.6	12.8						33.9					
1986	5.7			21.7		14.1	9.4	5.6						11.1	10.9						29.2					
1987	5.7					14.5	10.1	6.0						12.5	12.7						34.8					
1988	4.5			20.1		8.7	5.9	2.8						7.3	10.3			19.5	40.1		25.3					
1989	4.5			20.4		9.4	5.7	3.3							11.3		34.7	22.6	36.7		28.0					
1990	4.0			14.4		6.3	6.2	4.0						7.5			21.4	11.8	23.8	29.5	22.0					
1991	6.3			17.7		7.4	3.9	4.0									17.0	9.2	26.5	30.3						
1992	3.9	5.3	8.4	9.7	14.3	5.3	3.3	2.9				13.0					16.9	12.1	32.9	35.2						
1993	6.1	4.7	9.8	11.0	14.2	5.2	3.2	2.8				11.2						6.2	24.8	17.7						
1994	4.3	4.8	6.8	7.1	10.6	4.4	2.8	2.2		6.9		8.8					5.4	4.4	14.4	10.5						
1995	2.9	5.5	7.0	6.4	9.9	5.0		3.4				8.5				5.1	4.9	4.1	9.0	6.7	5.3					
1996	4.0	6.7	9.6	9.6	15.6	7.6				4.9		10.4	4.3	2.0	3.9	4.3	4.0	2.9	5.9	6.3	3.7					
1997	3.1	3.7	4.3	6.5	6.7	7.0		2.3		5.1		7.0	3.1		3.7	4.0	3.4	3.1	5.6	5.0	4.4					
1998	2.6	3.5	3.4	4.8	3.8	4.2	3.9	2.7		3.7		5.8	3.3		3.4	4.1	3.5	3.9	6.7	6.0	4.4		2.1			
1999	3.8	3.5	3.7	4.1	3.6	3.7	3.3	2.0			3.3	3.9	3.3	3.2	3.5	3.7	3.6	4.5	7.3	6.1	4.1	3.3	1.7			
2000	2.2	3.3	4.4	3.2	2.6	3.9	3.9	2.2	1.9		3.2	3.8	2.9	2.3	3.4	3.0	3.0	2.6	4.7	4.1	3.4	2.0	2.1			
2001	1.5	2.2	2.5	2.2	1.4	2.7		1.1	1.9	2.5		3.8	2.5				2.9		5.3	5.0						
2002	1.7	2.1	1.9	1.6	1.5	2.7	2.0	1.1	1.7	2.5		3.2					Messungen eingestellt									
2003	1.9	2.9	1.7	1.9	2.2	3.3	2.5	1.3	2.1	2.8	2.1	2.7														
2004	1.16	2.25	1.49	1.54	1.10	Messungen eingestellt		1.08	1.01		1.9	2.9														
2005	1.06	1.78	1.19	1.31	1.42	eingestellt		1.34	1.36		2.1	2.5														
2006	0.99	2.22	1.60	1.66	1.39			1.11	0.99	Messungen eingestellt																
2007	1.08	2.07	1.00	1.41	1.23			0.89	0.70																	
2008	1.03	1.84	1.82	1.26	1.10			0.65	0.52																	
2009	1.15	1.04	1.82	1.40	1.53			0.70	0.56																	
2010	0.80	1.70	1.86	1.75	1.49			0.80	0.76																	

	Wester- land	Zingst	Neuglob- sow	Waldhof	Schmücke	Deusel- bach	Brotjackl- riegel	Schau- insland	Forellen- bach	Helgo- land	Aukrug	Uecker- münde	Schorf- heide	Bassum	Gittrup	Falken- berg	Melpitz	Leine- felde	Lücken- dorf	Lehn- mühle	Regnitz- losau	Öhringen	Raisting
2010	0.80	1.70	1.86	1.75	1.49			0.80	0.76														
2011	0.92	1.36	1.43	1.27	1.29			0.49	1.08														
2012	0.66	1.14	1.39	1.06	1.27			0.61	1.11														
2013	0.73	1.13	1.09	1.02	1.10			0.52	1.65														
2014	0.34	1.63	1.33	1.06	0.96			0.56	1.31														
2015	0.28	0.60	0.80	0.67	0.78			0.46	1.15														
2016	0.32	0.58	0.92	0.72	0.68			0.49	1.28														
2017	0.35	0.79	0.74	0.77	0.56			0.60	0.76														
2018	0.32	0.90	0.96	0.77	0.98			0.50	0.89														
2019	0.23	0.70	0.77	0.66	0.74			0.26	0.84														
2020	0.40	0.71	0.90	0.70	0.66			0.32	1.13														
2021	0.31	0.84	0.58	0.75	0.75			0.45															
2022	0.51	1.15	0.82	0.93	0.54			0.57															

Quelle: Daten des Luftmessnetzes des Umweltbundesamtes